Rapport N°. 27.

De l'observation de Monsieur Ballay, chirurgien en chef de l'hôtel-Dieu d'orleans ~~H. H.~~ sur une imperforation de l'anus.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

L'academie nous ayant chargé, Monsieur pelletan et moi, de l'examen de la pièce anatomico-pathologique, que lui avait adressé Monsieur Ballay; cet examen fut fait sur le champs et nous fimes voir 1°. que la cavité de l'intestin rectum existait jusqu'à son sphincter interne; 2°. nous avons aussi fait observer que la où se terminait l'incision qui a été faite pour remedier à ce vice de conformation, la commencait la cavité de l'intestin et que consequemment il eut été facile d'y penetrer avec le bistouri ou le troiscart.

D'après ces faits, ce rapport des parties, on doit sans doute, être surpris que M. ballay n'ait pas senti avec le doigt porté dans le fond de l'incision, l'ondulation ou au moins la saillie que devaient faire les fluides stercoraux: on l'est également lorsqu'après ~~que après~~ avoir reconnu que la fin de ~~la~~ la premiere incision qu'il avait fait, n'était pas éloignée de la cavité de l'intestin ~~d'avante~~ et que s'il l'eut prolongée un peu d'avantage, il aurait indubitablement et sans aucun risque ouvert, avec le pharingotome, l'intestin rectum, il avance qu'il manquait au moins trois pouces de cet intestin et que son imperforation se propageait dans l'intérieur du ventre vers le haut du bassin.

M. Ballay demande ensuite, si il ne serait pas plus avantageux de faire cette opération en deux tems? et il propose de commencer avec le troiscart et l'instrument tranchant

ARC n°26

tranchant, puis de terminer avec le pharingotome.

Avant de repondre à cette question, nous devons faire observer qu'il y a beaucoup de cas où il ne faut point pratiquer d'opération, par la quelle serait au moins inutile, comme lorsque la cavité de l'intestin est oblitérée dans toute son étendue ou lorsque cet intestin va se terminer dans le vagin, la vessie, audessus du pubis &c. en un mot on ne doit se determiner à faire une incision dans la région du périné, où devrait se trouver l'anus, que lorsque l'accumulation des matières se fait appercevoir ou sentir; dans toute autre circonstance on s'expose à faire une opération inutile ~~ainsi que nous venons~~ et quelquefois dangereuse, si dans l'intention d'atteindre l'intestin on plongeait fort avant les instrumens.

d'après cela on voit qu'on peut et qu'on doit terminer l'opération dans un tems, et que le troicart avec le bistouri suffisent pour l'exécuter.

Le cas dont il est question, les phenomenes observés, la terminaison facheuse, ne presentent rien qui puisse concourir aux progrès de l'art de guérir; il peut cependant servir à prouver la nécessité d'examiner si un enfant ~~nouveau né~~ n'apporte pas en naissant, un vice de conformation, qui puisse lézer des fonctions né-cessaires à son existence car M. Bellay n'a reconnu l'indisposition de cet enfant que le lendemain et après que la nourice l'eut averti, que non seulement il ne voulait pas teter, mais qu'il n'avait pas rendu de méconium

Nous n'avons pu jusqu'a present qu'infirmer en grande partie, ce qu'a avancé l'auteur, nous allons cependant avoir l'avantage de le louer ~~[illegible]~~ d'avoir administré à l'enfant ~~qui~~ un leger purgatif pour determiner les

matières stercorales à se porter vers la partie inférieure de l'intestin rectum : le moyen a été de quelque utilité dans des circonstances semblables.

Ce jeudy 15 7bre 1785

L'Héritier

Pelletan

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE